



МИДИВИРИН

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Биокомплекс с иммуномодулирующим и ноотропным действием. Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям, является источником микроэлементов, необходимых для нормальной функции иммунной системы. В состав биокомплекса входит фрагментированная ДНК и гидролизат белков двустворчатого моллюска карбикулы, обитающего только в реках Японии и Сахалина в месте впадения пресной воды в океан.

Карбикула (*Corbicula japonica*) – малоизвестный, но чрезвычайно ценный двустворчатый моллюск, обитающий на Дальнем Востоке. Препараты, полученные из карбикулы, обладают рядом уникальных целебных свойств. Гидролизат карбикулы содержит калий, селен, йод, фтор и кобальт, а также витамины группы В, обеспечивающие регенераторные процессы в красном костном мозге и нормальную функцию центральной нервной системы. Препараты из карбикулы применяют для укрепления и восстановления иммунитета, что особенно важно после тяжелых вирусных инфекций.

Карбикула содержит глицин, таурин, антиоксиданты, которые способствуют регенерации печёночной ткани, особенно при гепатите и циррозе. В клетках печени таурин принимает участие в синтезе желчных кислот, поэтому препятствует развитию диабетических осложнений. Таурин обладает противовоспалительной активностью, улучшает остроту зрения и защищает от развития катаракты. Таурин играет роль передатчика нервных импульсов, а также нормализует обмен жиров и углеводов, способствует снижению веса за счет уменьшения аппетита.

Ненасыщенные жирные кислоты Мидивирин (омега 2 и омега 3), содержащиеся в океанических моллюсках, поддерживают структурную организацию липидных компонентов мембран клеток. Это объясняет способность карбикулы препятствовать развитию атеросклероза. Вещества с хиноидной структурой придают моллюскам окраску и одновременно защищают их от воздействия любых вредоносных вирусов. Уникальный природный механизм резистентности к вирусам моллюска унаследовали от растений. Именно вещества с хиноидной

структурой являются действующим началом противовирусного и противобактериального эффекта препарата Мидивирин.

Фрагментированная ДНК – это комплекс полимерных цепочек (олигонуклеотидов), имеющих различное количество нуклеотидных пар. Они образуются в процессе глубокой переработки молок лососевых рыб с последующим выделением хромосом, которые подвергаются ультразвуковой обработке так, что ДНК разрезаются на фрагменты различной длины. Полученный биокомплекс фильтруют и подвергают лиофильному высушиванию. Фрагменты ДНК сохраняют полимерную структуру, но полностью теряют свою видоспецифичность, и, благодаря применению AXIS технологии, хорошо усваиваются в желудочно-кишечном тракте.

Фрагментированная ДНК поддерживает иммунный ответ, активируя макрофаги и Т-лимфоциты, стимулирует репаративные процессы, способствует заживлению трофических язв, ускоряет эпителизацию слизистых желудочно-кишечного тракта и кожных покровов.

Рекомендуется:

- С целью усиления иммунитета против вирусных инфекций;
- Для профилактики возрастных нарушений органов зрения;
- Для профилактики дегенеративных заболеваний центральной нервной системы;
- В программах лечения и восстановления периферической нервной системы;
- При синдроме хронической усталости;
- Для повышения выносливости к физическим нагрузкам;
- В качестве вспомогательного средства в терапии заболеваний печени;
- При нарушении обмена холестерина и профилактики атеросклероза;
- Для коррекции метаболического синдрома и профилактики сахарного диабета 2 типа

Принимать по 1 капсуле 3 раза в день короткими курсами (3-5 дней) или по 1 капсуле 2 раза в день курсами по 4-6 недель.

